


Voluntariado Ambiental para a Água

Folha Auxiliar da Ficha de Campo RIOS

FOTOGRAFIAS - Sempre que possível junta fotografias do local à Ficha de Campo. Duas fotografias de enquadramento (uma para montante e outra para jusante do local de observação) e as que considerares necessárias para mostrar as características especiais do local, como por exemplo, elementos de artificialização da Linha de água (muros, açudes, pontes, etc) ou elementos naturais interessantes (manchas de vegetação, espécies animais, etc)


Esquema do local de observação



É muito importante a escolha do local de observação. A partir dele vais realizar toda a monitorização. Deve ser escolhido por ser um local de interesse, do ponto de vista natural ou artificial. Poderá ou deverá ser representativo das condições do resto da ribeira. Tem de garantir a observação das margens e do leito do rio. Ideal será permitir o acesso ao leito. A monitorização dos 100m do troço da ribeira poderá ser efectuada a partir das margens ou do leito, com as devidas cautelas.

Assinala numa carta militar ou em fotografia aérea o local de observação (www.voluntariadoambientalagua.com).

Sistema ribeirinho (adaptado do Guia do INAG "Requalificação e limpeza de linhas de água")



Um sistema ribeirinho é constituído por:

- 1) Leito - espaço por onde corre a água. Variável ao longo do ano;
- 2) Corpo de Água - é a própria água;
- 3) Galeria Ripícola - vegetação ribeirinha;
- 4) Sistema Antrópico - zona modificada pelo Homem, por ex associada ao uso agricultura/florestal, à pecuária, à indústria, etc.


3.1 Caudal/Fluxo/Escoamento:



Tipos de fluxo:

- 1 - Fluxo não perceptível
- 2 - Fluxo Laminar (Liso)
- 3 - Fluxo Turbulento (com força)

4.1 Grau de artificialização:



Com a artificialização das margens e leitos das ribeiras os ecossistemas ficam alterados, perdendo biodiversidade. A artificialização pode também gerar problemas hidráulicos (escoamento) colocando em risco pessoas e bens.

4.2 Perfil das margens:



As margens podem ser mais ou menos declivosas/estáveis em função do substrato e do regime hidrológico.

- 1 - Vertical
- 2 - Inclinado ($> 45^\circ$)
- 3 - Suave
- 4 - Composto

Esta Folha Auxiliar será essencial para o correcto preenchimento da Ficha de Campo.


Voluntariado Ambiental para a Água

Folha Auxiliar da Ficha de Campo RIOS

4.3 Tipo de substrato do Leito (Escala)


Areia e areão	
Gravilha	
Pedras/seixos	
Pedras grandes/pedregulhos	

4.4 - Erosão e assoreamento:



O leito de uma ribeira pode ser mais ou menos meandrizado (com curvas) dependendo da dureza do seu substrato, do regime hidrológico e das intervenções humanas nos vales. A meandrização é um processo de equilíbrio natural, constituindo um mecanismo de resposta aos processos de assoreamento e de erosão.

5.1 Presença de Árvores:




5.3 Vegetação Invasora /Exótica e 5.4 Vegetação Autóctone/originária do local:

A informação sobre a vegetação natural (autóctone) e a vegetação invasora e exótica poderá ser consultada na publicação “Flora Aquática e Ribeirinha” e ou em folhetos disponíveis no site www.voluntariadoambiental.com que, convém levar nas saídas de campo.

6 Fauna avistada (alguns exemplos)

AVES



Esta Folha Auxiliar será essencial para o correcto preenchimento da Ficha de Campo.

Voluntariado Ambiental para a Água

Folha Auxiliar da Ficha de Campo RIOS

MAMÍFEROS E RÉPTEIS



Lontras



Ratos de água



Lagartos



Cágados



Cobras-de-água

PEIXES E ANFÍBIOS



Enguias



Outros Peixes



Salamandras e Tritões



Rãs

Ilustrações de João Eduardo Pinto, © 2010

Esta Folha Auxiliar será essencial para o correcto preenchimento da Ficha de Campo.